

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ГЕПАТОАКТИВ для нормализации функции печени у сельскохозяйственной птицы и животных.

(организация-разработчик: «MPA Veterinary medicines and additives, S.L.», Испания.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование кормовой добавки: ГЕПАТОАКТИВ (HEPATOACTIVE).

Кормовая добавка представляет собой сочетание ингредиентов, выбранных для улучшения обмена веществ в печени, чтобы избежать проблем, возникающих после лечения, токсикоза, при снижении количества потребляемого корма, потери веса, ухудшении индекса воспроизведения, повышенной восприимчивости к заболеваниям и высокой смертности, вызванной печеночной недостаточностью.

2. Форма выпуска: раствор для перорального применения.

3. В 1мл ГЕПАТОАКТИВ содержится:

Карнитин гидрохлорид	25 мг
Метионин DL	10 мг
Холина хлорид	18,75 мг
Магния сульфат	10 мг
Сорбит	200 мг
Цинарин	5 мг

В качестве вспомогательных веществ: пропилен гликоль – 30мг, сорбат калия – 2,68мг, вода очищенная до 1мл.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

По внешнему виду представляет собой прозрачный раствор темно-коричневого цвета, слегка вязкий с определенным запахом.

4. ГЕПАТОАКТИВ выпускают расфасованным по 1л, 5л и 25л в бутылки или канистры из полипропилена высокой плотности белого цвета и герметично укупорены алюминиевой капсулой и закрыты зелёной крышкой.

5. Хранят в закрытой упаковке, в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °С до 30 °С.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

Не использовать по истечении срока годности.

6. Хранить ГЕПАТОАКТИВ следует в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованная кормовая добавка или неиспользованные рабочие растворы должны быть утилизированы в соответствии с требованиями законодательства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

8. ГЕПАТОАКТИВ содержит ингредиенты с выраженным гепатостимулирующим, гепатопротекторным, желчегонным и желчевыводящим действиями, включает активные ингредиенты, которые улучшают метаболизм печени и пищеварение, оптимизируя основные физиологические функции.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

9. ГЕПАТОАКТИВ применяют перорально с питьевой водой индивидуально или групповым способом в количестве 0,5-1мл на 1л воды. Добавлять в воду каждые 24 часа в течение 5 дней. Перед употреблением взболтать.

10. Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. Кормовая добавка совместима с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

12. Продукцию животноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ.

13. При работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Запрещается использование упаковки из-под кормовой добавки для пищевых целей.

Инструкция по применению разработана компанией «MPA Veterinary medicines and additives», Испания.

Адрес организации-производителя: «PH Ibèrica , S.L.», C/Mogoda, 16-18 - Poligon Industrial Can Salvatella, 08210 Barberà del Vallés, Barcelona, Spain (C/Могода, 16-18 – Полигоно Индустириал Кан Салвателла, 08210 Барбера дэль Вальес, Барселона, Испания).

Регистрационный номер: РК-ВП-3-2499-13

